

7.4. Anhang 9: Substitutionsempfehlungen Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) Analoga (ATC A10BJ)

Während des Spitalaufenthalts in einer Institution der Insel Gruppe sollen die GLP-1-Analoga möglichst wie folgt substituiert werden.

Nach dem Spitalaufenthalt soll dem Patienten wieder das ursprünglich verordnete Arzneimittel verschrieben werden, es sei denn, der Wechsel ist medizinisch begründet.

Detaillierte Angaben zu den einzelnen Wirkstoffen sind in der Übersichtsliste 7.3.6. GLP-1-Analoga zusammengestellt.

Kurzwirksame GLP-Analoga:

Wirkstoff	Originalpräparat	Erhältliche Dosierungen	Substitutionsvorschlag AML		Bemerkungen
Exenatid	Byetta®			Liraglutid → VICTOZA Inj Lös 6 mg/ml	
		5 mcg 2x/Tag	0.6 mg	1x/Tag	
		10 mcg 2x/Tag	1.8 mg	1x/Tag	
Liraglutid	Victoza®			Liraglutid → VICTOZA Inj Lös 6 mg/ml	
		0.6 mg 1x/Tag	0.6 mg	1x/Tag	
		1.2 mg 1x/Tag	1.2 mg	1x/Tag	
		1.8 mg 1x/Tag	1.8 mg	1x/Tag	

Substitutionsempfehlungen GLP-1-Analoga (ATC A10BJ)

7.4.-A9.-V01

Seite 2 / 3

Langwirksame GLP-Analoga:

Wirkstoff	Originalpräparat	Erhältliche Dosierungen	Substitutionsvorschlag AML	Bemerkungen
Dulaglutid	Trulicity®	0.75 mg 1x/Woche 1.5 mg 1x/Woche 3 mg 1x/Woche 4.5 mg 1x/Woche	Liraglutid → VICTOZA Inj Lös 6 mg/ml Start 7 Tage nach letzter TRULICITY-Dosis	1 Tag nach der letzten VICTOZA-Dosierung kann TRULICITY verabreicht werden. Anschliessend im gewohnten Rhythmus weiterfahren (1x/Woche).
			0.6 mg 1x/Tag	
			1.8 mg 1x/Tag	1.8 mg (0.3 ml) Liraglutid ist die maximale Tagesdosis.
			1.8 mg 1x/Tag	
			1.8 mg 1x/Tag	
Exenatid	Bydureon® BCise (= Depot)	2 mg 1x/Woche	Liraglutid → VICTOZA Inj Lös 6 mg/ml Start 7 Tage nach letzter BYDUREON BCise-Dosis	1 Tag nach der letzten VICTOZA-Dosierung kann BYDUREON BCise verabreicht werden. Anschliessend im gewohnten Rhythmus weiterfahren (1x/Woche).
			1.8 mg 1x/Tag	
			Liraglutid → VICTOZA Inj Lös 6 mg/ml Start 7 Tage nach letzter OZEMPIC-Dosis	
Semaglutid	Ozempic®	0.25 mg 1x/Woche 0.5 mg 1x/Woche 1 mg 1x/Woche 2 mg 1x/Woche	0.6 mg 1x/Tag	1 Tag nach der letzten VICTOZA-Dosierung kann OZEMPIC verabreicht werden. Anschliessend im gewohnten Rhythmus weiterfahren (1x/Woche).
			1.8 mg 1x/Tag	
			1.8 mg 1x/Tag	1.8 mg (0.3 ml) Liraglutid ist die maximale Tagesdosis.
			1.8 mg 1x/Tag	
			1.8 mg 1x/Tag	

Substitutionsempfehlungen GLP-1-Analoga (ATC A10BJ)

7.4.-A9.-V01

Seite 3 / 3

Orale GLP-Analoga:

Wirkstoff	Originalpräparat	Erhältliche Dosierungen		Substitutionsvorschlag AML		Bemerkungen
Semaglutid	Rybelsus®			Liraglutid → VICTOZA Inj Lös 6 mg/ml		1.8 mg (0.3 ml) Liraglutid ist die maximale Tagesdosis.
		3 mg	1x/Tag	0.6 mg	1x/Tag	
		7 mg	1x/Tag	1.8 mg	1x/Tag	
		14 mg	1x/Tag	1.8 mg	1x/Tag	

Vernehmlassung: Prof. Dr. Markus Laimer, Stv. Klinikdirektor & Chefarzt Diabetologie, Endokrinologie, Ernährung und Metabolismus
Arzneimittelkommission Insel Gruppe
Prof. Dr. Manuel Hachke, Klinische Pharmakologie, Vorsitz AMK
Dr. Jörg Paul Isenegger, Chefarzt Innere Medizin, Riggisberg, Vertretung Landspitäler

Änderungshistorie

Version	Gültig ab	Änderungen
V01	01.11.2023	Ersterstellung

Autor:	Anne Eichenberger	gültig ab:	01.11.2023	Dateiname:	07_04_A9-V01 Substitutionsempfehlungen GLP-1-
Freigabe:	Edith Hufschmid	ersetzt:	neu		Analoga